

Kód pojišťovny

**DOPORUČENÍ LÉKAŘE**

poř. č.

Příjmení a jméno

Číslo pojištěnce

f.

Bydliště (adresa)

P - hraď pacient C - spoluúčast pacienta I - hraď ZP

**Rp.**



Sk. Kód

Cena

Sk. Kód



Dne:

Připravil:

Vydal:

# VAGILACT<sup>NTC</sup>

Pro Vaši intimní rovnováhu

● ISOFLAVONOIDY

● LACTOBACILLUS

● KYSELINA MLÉČNÁ

# VAGILACT<sup>NTC</sup>

## 10 VAGINÁLNÍCH TABLET

### Co je VAGILACT:

**VAGILACT** je zdravotnický prostředek k vaginálnímu použití ve formě 10 jednorázových vaginálních tablet.

### K čemu se VAGILACT používá:

**VAGILACT** pomáhá při přechodné změně rovnováhy uro-vaginální mikroflóry.

Pro urovaginální (mocopohlavní) systém je typické osídlení zdraví prospěšnými mikroorganismy, které působí jako přirozená ochrana proti vzniku bakteriální infekce: hodnota pH normálního poševního sekretu je přibližně 4,5 a tato kyselost je udržována normální hladinou ženských pohlavních hormonů – estrogenů a stálou mléčnou flórou.

Zdravé bakteriální osídlení ve sliznici pochvy je tvořeno především mléčnými bakteriemi. Tyto bakterie vytvářejí kyselinu mléčnou, která udržuje kyselé prostředí v poševní sliznici. Tato kyselost předchází a chrání před vznikem a dalším rozvojem infekce v pochvě.

Mikrobiologická rovnováha urogenitálního systému může být přechodně změněna hormonálními vlivy, jako je menstruace, menopauza, špatně prováděná hygiena, nebo častým užíváním tampónů, antikoncepčními prostředky nebo užíváním antibiotik.

V těchto případech, kdy je složení mikrobiálního osídlení uro-vaginálního systému změněno a počet mléčných bakterií je snížen, může dojít k růstu choroboplodných mikroorganismů (*Streptococcus*, mykoplazmata) a vzniku bakteriální infekce v pochvě. Nejčastějšími příznaky bakteriální infekce je pálení, svědění, změněný vzhled a zvýšené množství poševního výtoků.

### Jak VAGILACT působí:

Každá tableta obsahuje mléčnou bakterii (*Lactobacillus acidophilus*), kyselinu mléčnou a sójové isoflavonoidy.

Tableta tohoto složení se rozpustí v pochvě a během několika minut uvolní mléčné bakterie a kyselinu mléčnou, které sníží hodnotu pH v pochvě na hodnotu 4 až 4,5 a tak zastaví růst choroboplodných mikroorganismů. Sójové isoflavonoidy, také obsažené v tabletě, podporují

tvorbu kyseliny mléčné v poševní sliznici a pomáhají snížit pH a obnovit normální stav a pružnost poševní stěny.

### Jak se VAGILACT používá:

Každou vaginální tabletu vyjměte z blistry a okamžitě použijte. Každou vaginální tabletu použijte pouze jedenkrát.

Při vyjímání tablet z blistry buďte opatrní. Jemně zatlačte na jednu stranu tablety, ale ne uprostřed, tableta by se mohla zlomit. Můžete také jemně naříznout zadní stranu blistry, odloupnout hliníkovou fólii a tabletu vyjmout. Tabletou zaveďte hluboko do pochvy, aby se rychle rozpustila.

### Kdy a jak dlouho se VAGILACT používá:

Začněte užívat tablety 10 dnů před zahájením menstruace a/nebo okamžitě po ukončení menstruace.

Užívejte jednu vaginální tabletu, nejlépe večer před spaním, po dobu prvních 10 dnů.

Pokud to bude nutné, můžete používání prodloužit na dobu nejdéle 20 dnů.

Nepřekračujte maximální délku používání 20 dnů bez porady s Vaším gynekologem.

### Varování:

Nepoužívejte tablety **VAGILACT** spolu s dalšími zdravotnickými prostředky pro vaginální použití bez předchozí konzultace s Vaším gynekologem.

**VAGILACT** nezpůsobuje místní podráždění, ale v případě přecitlivlosti okamžitě vyhledejte Vašeho lékaře. Příležitostně, zvláště během prvních dnů používání, se může objevit svědění, které během následujících 2–3 dnů ustane.

### Bezpečnost a upozornění

**VAGILACT** ukládejte mimo dosah dětí. Tablety nejzte.

Pokud je obal zdravotnického prostředku poškozený nebo otevřený a pokud jsou tablety rozdrolené, nepoužívejte je. Tato poškození mohlo způsobit špatné skladování a prostředek může být předčasně rozložen. Tablety mohou mít slabě tečkovany povrch, který je způsoben přírodním původem jejich složek. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti na obalu, nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

### Jak se VAGILACT skladuje:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevystavujte zdrojům tepla, slunečnímu záření a uchovávejte v suchu.

### Kdo VAGILACT vyrábí: NTC S.r.l. – C.so Buenos Aires, 9 – 20124 Milano, Itálie

### Kdo VAGILACT v ČR distribuuje:

Heaton<sub>o.s.</sub>

Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, [www.heaton.cz](http://www.heaton.cz)

